

Une forme albinos de *Pteroglossa glazioviana* (Orchidaceae, Spiranthinae)^a

Renato Ximenes Bolsanello¹

Mots-clés/Keywords/Palavras-chave : albinisme/albinism/albinismo, Brésil/Brazil/Brasil, forêt atlantique/Atlantic forest/Mata Atlântica, forêts humides/rainforests/florestas úmidas.

Résumé

Une forme albinos de *Pteroglossa glazioviana*, originaire de la *Serra do Castelo*, ES (Brésil), est décrite et illustrée.

Abstract

An albino form of *Pteroglossa glazioviana* (Orchidaceae, Spiranthinae) – Albinism is rarely reported for *Pteroglossa*. Such a form, observed in the *Serra do Castelo* (ES, Brazil), is presently described and illustrated for *Pteroglossa glazioviana*.

Resumo

Uma forma albina de *Pteroglossa glazioviana* (Orchidaceae, Spiranthinae) – Albinismo é raramente reportada para *Pteroglossa*. A forma é descrita e ilustrada para *Pteroglossa glazioviana*.

Les formes albinos sont rares chez les *Pteroglossa* Schlechter, et chez les Spiranthinae d'une manière plus générale. La forme décrite ici est basée sur un spécimen provenant des forêts de la *Serra do Castelo*, Espírito Santo (Brésil). D'après ses caractères morphologiques, ce spécimen correspond tout à fait à *Pteroglossa glazioviana* (Cogniaux) Garay. Cette espèce est commune dans les forêts humides de la *Mata Atlântica*, principalement

^a : manuscrit reçu le 2 décembre 2015, accepté le 9 décembre 2015

article mis en ligne sur www.richardiana.com le 11/12/2015 – pp. 57-59 - © Tropicália
ISSN 1626-3596 (imp.) - 2262-9017 (élect.)

dans les états du Minas Gerais jusqu'au Paraná et au Paraguay (Chiron & Ximenes Bolsanello, 2015). Le spécimen albinos se trouvait parmi plusieurs représentants de la forme typique. La forme nouvelle est ici validée, décrite et illustrée.



Fig. 1 : *Pteroglossa glazioviana* f. *alba*
plante *in situ* [a], inflorescence [b] et fleur [c]
ph. Renato X.Bolsanello

***Pteroglossa glazioviana* (Cogniaux) Garay**

Botanical Museum Leaflets 28 : 350 (1982)

Pelexia glazioniana Cogniaux, *Flora Brasiliensis* 3(4) : 157 (1895)

***Pteroglossa glazioviana* f. *alba* Ximenes Bolsanello, forma nova**

Haec herba Pteroglossa glazioviana (Cogniaux) Garay forma typica similis est sed floribus luteis pallidis lineatis differt.

Type : Brésil, Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, distrito de Rio Bonito, floração em março de 2013, R.X.Bolsanello sn (MBML 49235).

Etymologie : *alba* fait référence au caractère albinos de ce taxon.

Les parties végétatives et florales de cette forme sont identiques à celles du *Pteroglossa glazioviana* typique. Seule la couleur des fleurs (blanc marqué de veines jaune pâle) la distingue de la forme typique chez qui les veines sont vertes. Fig. 1.

Ce nouveau taxon diffère aussi, par la couleur de ses fleurs, de la variété décrite par Cogniaux (1907) sous le nom de *Pelexia glaziovii* var. *paraguayensis*.

Références

Chiron, G.R. & R.X.Bolsanello, 2015. *Orchidées du Brésil - As orquídeas da Serra do Castelo (Espírito Santo, Brasil)*, volume 1. Tropicalia, Lyon (France). 371pp.

Cogniaux, A., 1907. Notes sur les orchidées du Brésil et des régions voisines. Première partie – Additions à la Flora Brasiliensis. *Bulletin de la Société Royale de botanique de Belgique*, 43 : 266-339.

1 : Rua Dom Jorge de Menezes 1084, Centro Vila Velha, ES – CEP 29100-250 (Brésil)
renatoxb@hotmail.com